

The top corners of the slide feature decorative geometric shapes. The top-left corner has a light blue square with a darker blue square overlapping it. The top-right corner has a light blue square with a darker blue square overlapping it.

Especies Suplementarias


Rolando Demanet Filippi
Dr. Ingeniero Agrónomo
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medioambiente
Universidad de La Frontera

Cátedra de Praderas y Pasturas
2025

The bottom-right corner of the slide features decorative geometric shapes, including a light blue triangle and a darker blue triangle overlapping it.



Las especies suplementarias corresponde a aquellas que permiten otorgar forraje al ganado en periodos donde las pasturas permanentes o de rotación no generan la suficiente cantidad de materia seca para cumplir con los requerimientos de los animales



Curva de crecimiento del pastizal templado en Temuco, Valdivia y Futrono

***Avena* spp. (Avena)**

- ✓ Es el forraje suplementario mas importante de la sur del país
 - ✓ Tiene por objetivo ser utilizada para pastoreo y soiling de invierno y elaboración de ensilaje y heno
 - ✓ Además se utiliza en grano seco entero o procesado en alimentación animal
 - ✓ Las especies mas utilizadas como forraje suplementario son *Avena strigosa* Schreb (2n) y *Avena sativa* L. (4n)
-

Todos los cultivares son utilizados en sistemas de doble propósito:

- ✓ Pastoreo invernal
- ✓ Elaboración de ensilaje
- ✓ Cosecha de grano

- ✓ *Nehuén*
- ✓ *Urano*
- ✓ *Neptuno*
- ✓ *Saturno*
- ✓ *Supernova*
- ✓ *Symphony*



Siembra voleo sobre
rastroy de maíz para
pastoreo invernal




Pastoreo invernale



Avena sativa L.
destinada a la
elaboración de ensilaje





Rendimiento de cereales de grano pequeño. Estación Experimental Maquehue.
Temporada 2015/2016

***Hordeum vulgare* L. (Cebada)**

- ✓ El principal objetivo de la cebada es la elaboración de ensilaje de calidad
 - ✓ Es una importante opción en zonas con condiciones climáticas adversas
 - ✓ Es el cereal mas precoz y que permite siembras tardías en áreas con problemas de suelo y clima
-




Siembra de cebada
híbrida cuyo destino es
la elaboración de
ensilaje

Es una especie poco
tolerante a la acidez
de los suelos



Cebadas híbridas
destinadas a la
elaboración de ensilaje
de corte directo





Rendimiento de cereales de grano pequeño. Estación Experimental Maquehue.
Temporada 2015/2016


***Triticale x Triticosecale* sp. (Triticale)**

- ✓ Es utilizado principalmente para elaboración de ensilaje de calidad
 - ✓ Triticale es un cereal de alta rusticidad y productividad
-

- ✓ Los cultivares primaverales son en ocasiones sembrados en verano para pastoreo invernal
 - ✓ Estos cultivares presentan una tasa de crecimiento inicial inferior a la avena, pero son mas tolerante a las heladas
 - ✓ La producción de invierno se verifica en los meses de julio y agosto y no supera las 2 ton MS/ha
 - ✓ Para ensilaje puede alcanza producciones superiores a 20 ton MS/ha, en cultivares de primavera e invierno
-

Aguacero es el cultivar mas utilizado en el sistema de doble propósito: pastoreo invernral y ensilaje o grano





Rendimiento de cereales de grano pequeño. Estación Experimental Maquehue.
Temporada 2015/2016

Fuente: Demanet, García, 2017


***Secale cereale* L. ssp. *Cereale* (Centeno)**



- ✓ Centeno corresponde a una especie de alta rusticidad muy poco utilizado en producción animal y la siembra se limita a sectores marginales en suelos de bajo nivel de fertilidad
 - ✓ Hoy con la presencia de nuevos cultivares de alto rendimiento este cultivo ha vuelto a ser una interesante opción de doble propósito: pastoreo invernal y ensilaje o grano en primavera
-

Cultivar	Ploidía	Floración
Generator	2n	Precoz
Bonfire	2n	Precoz





Rendimiento de cereales de grano pequeño. Estación Experimental Maquehue.
Temporada 2015/2016


Fuente: Demanet, García, 2017

***Triticum aestivum* L. (Trigo)**

El trigo es un cereal que se establece con el objetivo de elaborar ensilaje, en áreas donde el maíz no tiene opción



- ✓ No es habitual el uso de este cereal en pastoreo invernal, sin embargo, es factible su utilización
 - ✓ Los cultivares mas utilizados para elaboración de ensilaje son aquellos de habito alternativo y primaveral
-



Rendimiento de cereales de grano pequeño. Estación Experimental Maquehue.
Temporada 2015/2016

***Zea mays* L. (Maíz)**

✓ El maíz (*Zea mays* L.), es el cultivo suplementario de mayor expansión en la región templada y constituye una opción para elaborar ensilaje de calidad, con alto contenido de energía

Siembra de maíz para
ensilaje





100.000 semillas por hectáreas

Medición de la
temperatura del
suelo




Precipitaciones de alta intensidad provocan serios problemas en la zona templada






Un buen control se inicia con un adecuado barbecho químico e identificación de las malezas que se quieren controlar



Efecto de la fertilización y el control de malezas en el rendimiento de maíz para ensilaje. Estación Experimental Maquehue. Universidad de La Frontera. Temporada 2019/2020.



Producción de materia seca de 22 híbridos de maíz para ensilaje. Predio Pozo Brujo. Futrono. Temporada 2019/2020

Evaluación
de híbridos
de maíz para
ensilaje



Momento de cosecha

Estado de madurez del grano,
porcentaje de materia seca y
momento óptimo para la cosecha del
maíz para ensilaje

Madurez del Grano		% MS Planta entera	Momento de elaborar ensilaje
Lechoso		< 20	X
Semi pastoso		20 - 28	X
Pastoso		29 - 32	√√
Maduro		33 - 35	√√√
Madurez completa		36 - 45	√
X : No elaborar ensilaje √√ : Inicio elaboración de ensilaje √√√ : Momento óptimo de cosecha √ : Maíz sobre maduro			



La cosecha en
estado óptimo
genera un ensilaje
de calidad



La cosecha tardía
reduce la calidad
y aumenta las
pérdidas



Parámetro	Nivel esperado en el Ensilaje
Materia seca (%)	33 - 35
pH	4,0- 4,2
N amoniacal (%)	< 5
FDN (%)	35 - 40
EM (Mcal/kg)	2,80 - 3,20
Digestibilidad de FDN (%)	65 - 75
Contenido de Almidón (%)	35 - 40
Digestibilidad del Almidón (%)	80 - 85



Consumo de
ensilaje de
calidad

***Sorghum bicolor* (L.) (Sorgo)**

En Chile su utilización
esporádica en producción
animal ha estado
circunscrito a la zona
mediterránea para
pastoreo de verano y
conservación de forraje



- ✓ A diferencia del maíz es capaz de soportar periodos prolongados de sequía y logra una rápida recuperación ante la presencia de agua
- ✓ Los requerimientos de agua se ubican entre uno y dos tercios de los necesarios para el cultivo de maíz






Para pastoreo o soiling de verano en su mayoría son el resultado del cruzamiento entre *Sorghum drummondii* (Steud.) Millsp. & Chase (pasto sudan) y *Sorghum bicolor* x *S. bicolor* var. Sudanese (pasto sudan híbrido) y se denominan pasto sudan o sudangrass



Para elaboración de ensilaje se utilizan los sorgos graníferos pertenecientes a la especie *Sorghum bicolor* (L.) Moench que en su mayoría son híbridos y tienen un crecimiento erecto y al momento de la cosecha pueden alcanzar una altura de sobre tres metros

Para pastoreo o soiling de verano se utilizan sorgos de multi cortes que son híbridos de sorgo con pasto sudan. Estos rebrotan post utilización y según la disponibilidad de agua y fertilidad del suelo es posible tener dos o tres utilizations en el periodo estival





Efecto de la distancia entre hilera (35, 50 y 70 cm) en el rendimiento de tres híbridos de sorgo granífero destinado a la producción de ensilaje. Estación Experimental Maquehue. Universidad de La Frontera. Temporada 2019/2020. Convenio Universidad de La Frontera – Compañía Internacional de Semillas.

***Pisum sativum* L. (Arveja)**



Planta de tipo afila
que le permite
permanecer erecta
hasta cosecha



Pastoreo y
conservación de
forraje: heno y
henilaje



***Lupinus albus* L. (Lupino)**

A close-up photograph of a cluster of blue lupine flowers. The flowers are in various stages of bloom, with some fully open and others as buds. The petals are a vibrant blue color. The background is a soft, out-of-focus green, suggesting foliage. The lighting is bright, highlighting the texture of the petals.

Se utiliza para pastoreo o soiling
de verano y ensilaje

Siembra de *Lupinus albus* L. para elaboración de soiling de verano



Momento de cosecha



***Vicia* spp. (Vicia o Arvejilla)**

Forraje que se utiliza para la elaboración de ensilaje o heno, por tanto es cosechado en primavera cuando las vainas basales de la vicia presentan el grano formado





Brassicas



Periodo de siembra y utilización de Brassicas

Especie	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A
Nabos												
Rutabagas												
Raps												
Coles												



***Brassica rapa* subsp. *rapa* (Nabos forrajeros)**

Plantas de nabos forrajeros



Consumo de nabos
utilizando franjas largas y
angostas



Consumo en pastoreo de nabos durante el periodo estival






Los animales
consumen
bajo el cerco
eléctrico al
menos 80 cm
de ancho



Los animales
consumen las hojas y
raíces de las plantas



Rendimiento acumulado y aporte de hojas y raíces desde la siembra a la cosecha de *Brassica rapa* subsp. *rapa* L.. Promedio de 110 predios lecheros. Plan lechero Watt's. Loncoche – Frutillar. Periodo 2010 – 2014.

***Brassica olearacea* L. (Coles forrajeras)**

Coles forrajeras en los
primeros estados de
desarrollo



Estructura de las
plantas de coles
forrajeras



La col forrajera es una especie suculenta de alta calidad bromatológica que es utilizada en pastoreo durante el periodo de otoño e invierno



***Brassica napus* var. *Napobrassica*
(*Rutabaga* o *Colinabos*)**

Este cultivo es una opción
para pastoreo de verano,
otoño e invierno



En siembras de baja densidad los bulbos son grandes muy lignificados y de difícil consumo



Se usa en pastoreo
con franjas angostas y
largas que permitan
al ganado hacer un
uso eficiente del
forraje disponible

Pérdidas en el campo
post consumo de
rutabaga




Brassica napus* L. var. *Napus

Este cultivo es una opción
para pastoreo de verano,
otoño e invierno




Consumo en pastoreo
de raps forrajero en
plena época invernal





Producción de *Brassica napus* subsp. *biennis* L. sembrado en **primavera** en seis localidades de la zona templada. Periodo 2011-2015.



Producción de *Brassica napus* subsp. *biennis* L. sembrado en **verano** en cinco localidades de la zona templada. Periodo 2011-2015.

***Beta vulgaris* L. (Remolacha forrajera)**

El objetivo de esta especie es generar forraje para el periodo de abril a septiembre donde los animales la consumen en pastoreo o soiling



Primeros estadios
de desarrollo



En la etapa inicial las plantas forman hojas en forma profusa



Después de 120 días la
raíz esta completamente
formada



Raíz de remolacha
forrajera que es
consumida por los
animales



Consumo de remolacha
en invierno utilizando
franjas largas y angostas



Estado en que queda el
suelo post consumo de
remolacha en el periodo
invernal



Cultivar	Tipo de semilla	Color de la raíz	Tipo de planta
Brigadier	Monogérmica*	Anaranjada	Mangel beet
Cerice	Monogérmica**	Amarilla	Fooder beet
Feldherr	Monogérmica**	Anaranjada	Fooder beet
Gerónimo	Monogérmica**	Anaranjada	Fooder beet
Kyros	Monogérmica**	Anaranjada	Fooder beet
Rivage	Monogérmica**	Anaranjada	Fooder beet
Fortimo	Monogérmica**	Roja	Fooder beet
Lipari	Monogérmica**	Roja	Fooder beet
Monro	Monogérmica**	Roja	Fooder beet
Gitty	Monogérmica**	Roja/Blanca	Fooder beet



Parámetros productivos de Remolacha forrajera y Brassicas

Especie	Dosis semilla/ha	EM (Mcal/kg MS)	PC (%)	ton MS/ha
Remolacha forrajera	100.000 sem/ha	2,9 a 3,0	12 a 15	20 a 40
Col forrajera	4 a 5 kg/ha	2,4 a 2,6	16 a 17	18 a 20
Nabos forrajero	3 a 4 kg/ha	2,6 a 2,7	17 a 18	16 a 18
Raps forrajero	5 a 6 kg/ha	2,4 a 2,6	19 a 20	10 a 12

***Cichorium intybus* L. (Achicoria)**



Achicoria es una planta que se caracteriza por presentar una alta tolerancia a la sequía, buen contenido de minerales en sus hojas y alta capacidad de penetrar sus raíces en el suelo



Mezcla polifítica que
incluye achicoria



Desde el punto de vista de la salud animal, la disminución de los efectos provocados por la acción de los parásitos y el mejoramiento del estado general de los individuos han demostrado que la presencia de taninos condensados en las plantas genera un efecto antihelmíntico en los animales



***Plantago lanceolata* L. (Siete venas)**

La persistencia de esta
pastura es entre 4 a 5
años y la longevidad
tiene directa relación
con el manejo de
pastoreo





**El tamaño de la semilla es pequeño
500.000 semillas/kilo. La dosis de
siembra es 8 a 10 kg/ha**

**Es factible mezclar este especie con
gramíneas y leguminosa y en ese caso la
dosis de semilla se reduce a 4 a 5 kg/ha**

The top-left corner features a dark blue square partially overlapping a light blue square. The top-right corner features a light blue square partially overlapping a dark blue square.

Especies Suplementarias

Rolando Demanet Filippi
Dr. Ingeniero Agrónomo
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medioambiente
Universidad de La Frontera

Cátedra de Praderas y Pasturas
2025

The bottom-right corner features a light blue square partially overlapping a dark blue square.